



FARMACIA FAVERO

Udine - via Tullio, 11
T. 0432502882
Pradamano - via Marinelli, 2
T. 0432671008
www.farmaciafavero.it

Nota bene: non è un foglietto illustrativo.
Queste informazioni possono essere utili
per un corretto e consapevole utilizzo del
medicinale ma non devono in nessun caso
sostituirsi alle indicazioni del medico prescrittore

PROPILTIOURACILE

Farmaco antitiroideo, utilizzato nella terapia dell'ipertiroidismo. Agisce inibendo la sintesi degli ormoni tiroidei e la conversione periferica di T4 (Tiroxina) nella forma attiva T3 (Triiodotironina)

Il dosaggio viene fissato dal medico singolarmente per ogni paziente: viene normalmente assunto da 1 a 3 volte al giorno **durante i pasti con un'adeguata quantità d'acqua.**

Incompatibilità: acido p-aminosalicilico, sulfatiazolo e sulfadiazina ne aumentano l'attività.

Passa la barriera placentare, ha una emivita di eliminazione di 1-4 ore circa e viene usato con cautela. È considerato in USA e UK il farmaco antitiroideo di scelta da somministrare durante il primo trimestre di gravidanza in caso di ipertiroidismo materno.

I preparati galenici a base di propiltiouracile sono vendibili **solo con prescrizione medica NON ripetibile.**

Dopo l'assunzione, l'assorbimento orale del farmaco è rapido quindi la possibilità d'insorgenza di effetti collaterali gastrointestinali è minima. Nonostante ciò bisogna prestare molta attenzione in quanto, in caso di abuso, possono verificarsi: eruzioni cutanee, orticaria; cefalea, febbre; nausea; anemia; polmoniti; grave insufficienza epatica. In tal caso è necessario contattare al più presto il medico curante.